



CA

CRITICAMENTE AMEAÇADO (2)

Grifo-de-dorso-branco, Abutre-de-cabeça-branca

A

AMEAÇADO (9)

Águia-pintada, Corvo-marinho-do-cabo, Alcatraz-do-cabo, Albatroz-de-nariz-amarelo do Índico, Grou-coroado-austral, Abutre-real, Águia-marcial, Secretário, Tordo-da-terra-malhado

VU

VULNERÁVEL (3)

Falcão-sombrio, Calau-gigante, Pardela-preta

QA

QUASE-AMEAÇADO (10)

Borrelho-de-colar-arruivado, Águia-coroada, Pilrito-de-bico-comprido, Abetarda-real, Ostraceiro, Flamingo-pequeno, Beija-flor de Neergaard Albatroz-de-coroa-branca ou Albatroz-arisco, Águia-cobreira-barrada-oriental, Pardela-escura ou Pardela-preta

EA

ESPÉCIES ENDÉMICAS DA ÁREA (3+1)

Apalis de Rudd, Beija-flor de Neergaard, Pintadinho-de-peito-rosado. Com uma possível quarta espécie, o Canário-de-peito-limão

FOCOS DE OBSERVAÇÃO DE AVES

Lagoa Xinguti

Um dos locais mais prolificos, que garantem encontros icônicos com aves durante todas as horas do dia. Conheça uma experiência em águas abertas, canaviais e brenhas adjacentes, florestas de areia, bem como as espécies de prados. Quando as condições são ideais, podem existir na área milhares de aves, em parte devido à pouca profundidade do lago e também devido à salinidade. Esteja atento/a à presença do Unha-longa-vermelho nas orlas gramíneas do corpo de água. Pode-se ouvir o chamar do Noitibó-do-Natal ao anoitecer perto da área de piquenique. Nas margens norte e leste, bem como nas orlas florestais ocorrem espécies como o Republicano, Touraco de Livingstone, Rouxinol-do-mato-castanho e o Apalis de Rudd, entre outras.

Áreas de pastagem a sul de Ponta Membene

A melhor observação de aves neste local é nas áreas de pastagem costeiras e nas manchas florestais na estrada a sul de Ponta Membene, a caminho de Ponta Milibangalala. Foram aqui registadas aves como a Abetarda-real e Abetarda-de-barriga-preta, Secretário, e Toirão-de-tronco-preto. Procure no céu o Abelharuco-oliváceo que voa para sul a partir de Machangulo para se alimentar nesta área. Existe uma variedade de beija-flores, incluindo o especial Beija-flor de Neergaard, que são atraídos para manchas de florestas isoladas. Tanto as Águias-cobreiras-de-peito-castanho como as Águias-cobreiras-de-peito-preto caçam nestas áreas de pastos.

Áreas importantes para a Conservação das Aves da BirdLife Internacional

O Parque Nacional de Maputo é uma das 16 Áreas de Importância para Aves. A região costeira de Moçambique foi substancialmente modificada pelas actividades humanas e o PNM representa uma parte da região a sul do rio Save onde a vegetação costeira natural é conservada.

Corredor de Futi Norte

Somente acessível com licenças para a rota para viaturas 4x4, onde os visitantes são alojados em acampamentos para 4x4, dois a norte e um a sul. Ao longo do rio, mantenha-se atento à visualização da Águia-cobreira-barrada-oriental que é aqui residente. A Quelea-de-cabeça-vermelha e os Tecelões-de-garganta-castanha existem nos canaviais. Também foi observado o Corujão-pesqueiro-de-Pel. A planície de inundação do Futi é prolífica durante as estações de chuva, observando-se o Cucal-preto-africano e a Felosa-de-cauda-larga.

Corredor de Futi Sul

O corredor sul liga o Parque Nacional de Maputo à Reserva de Elefantes de Tembe do outro lado da fronteira. É aqui que existem alguns dos melhores habitats secos para a observação de aves. A Tuta-de-garganta-branca e o Cucal-verde são localizados melhor pela vocalização. O Pintadinho-de-peito-rosado e o Atacador-de-poupa-preta são aqui residentes. Mantenha-se atento/a à observação da Bocarra-africana e do Beija-flor-de-garganta-azul-africano que se encontram regular mente nas copas altas.

Áreas de Pasto Abetasrs

Prováveis visitantes são o Unha-longa-vermelho, Abetarda-real, Abetarda-de-barriga-preta, Secretário, Toirão-de-tronco-preto, (durante inundações também o Toirão-do-mato) Abelharuco-oliváceo, cotovias, petinhas e tordos.

Brenhas de Dunas Costeiras

Este constitui um habitat apropriado para o Republicano, Touraco de Livingstone, o Rouxinol-do-mato-castanho, Apalis de Rudd, Olho-caranculado, Batis-de-Woodward, Picanços-oliváceos e Picanços-de-quatro-cores, e a linda Pintadinha-verde, que podem ser observados nas orlas florestais.

Savanas

Algumas das espécies incluem o Apalis de Rudd, o Abelharuco-oliváceo e os Picanços.

Áreas de Mangais

São comuns observações de beija-flores, Alcaravão-da-água, Abelharuco-oliváceo, Pica-peixe dos mangais e uma variedade de aves pernaltas, Maçaricos, Maçarico-tereque & Pilrito-de-Bico Comprido.

Área Costeira

As praias proporcionam um ponto privilegiado para observar as muitas aves pelágicas que ocorrem perto da costa após o mau tempo. Estas incluem o albatroz, o painho, e possíveis aves-tesourão. A costa e a praia servem de apoio como poleiro para as Gaivinas-de-bico-vermelho e várias espécies de ave pernalta se, se tiver sorte, para o Abutre-das-palmeiras.



Floresta Arenosa Seca

Algumas observações incluem o Beija-flor de Neergaard, a Águia-cobreira-barrada-oriental, Rouxinol-do-mato-castanho, Tuta-de-garganta-branca, Cucal-verde, Bocarra-africana, Pintadinho-de-peito-rosado, Beija-flor-de-garganta-azul-africano & Atacador-de-poupa-preta.

Corpos de Água, Canaviais & Sistemas de Água Doce e Salina

Os vários lagos suportam uma concentração espectacular de aves aquáticas, incluindo os socós, frangos-d'água, patos, cormorões ou corvos-marinhos, garças, colhereiros pernaltas, Cegonha-de-bico-amarelo, Jabiru, Pelicano-branco e o Flamingo-pequeno. Os canaviais oferecem habitats excelentes para passaros canoros e várias espécies de tecelões (como é o caso do Tecelão-amarelo). São icónicos a Quelea-de-cabeça-vermelha, Tecelão-de-garganta-castanha & Noitibó-do-Natal.

Savanas e Bordas dos Lagos

Esteja atento/a à presença de Apalis de Rudd, Atacador-de-poupa-preta, Picanço, e Abelharuco-oliváceo.

As árvores de grande porte que bordejam os lagos devem ser minuciosamente observadas para a presença de poleiros de Águia-rabalva ou Pigardo, de Águia-pesqueira, ou do Corujão-pesqueiro-de-Pel que é raro.

Sistema de água doce

Pode-se observar aqui uma concentração de aves aquáticas, incluindo os socós, frangos-d'água, patos, cormorões ou corvos-marinhos, garças, colhereiros pernaltas, Cegonha-de-bico-amarelo, Jabiru e o Pelicano-branco

Floresta Pantanosa


Podem-se observar aqui Bocarra-africana, Beija-flor-de-garganta-azul-africano, Cucal-preto-africano & Corujão-pesqueiro-de-Pel

Pântanos Salinos & Lamaçais/Lodaçais

Podem-se observar aqui a Gaivota-de-cabeça-cinzenta, aves pernaltas, e gaivinas.

Florestas Dunares Costeiras

Águia-cobreira-barrada-oriental, Beija-flor de Neergaard, Pintadinha-verde, Beija-flor-oliváceo & Cucal-verde entre outras espécies



ORIENTAÇÃO REGIONAL



As espécies de aves relativamente às quais o Parque foi identificado como um refúgio importante estão incluídas na Lista Vermelha da IUCN.


“Os habitats terrestres de prados, savanas e florestas que formam o extremo norte do Centro de Endemismo Vegetal de Maputaland listado pela IUCN são também listados pela BirdLife International como uma Área Importante para a Conservação e Biodiversidade de Aves (IBA), um estatuto conferido devido à ocorrência de espécies ameaçadas e de âmbito restrito”

06:00 – 17:00 (Outubro a Março) 07:00 - 16:00 (Abril a Setembro)

Departamento de Turismo: resvas@parquemaputo.gover.mz

Números de contacto para Reservas: +258 (85) 600 0900 ou +258 (83)333 6727 www.parquemaputo.gov.mz

Contactos de urgência: +258 (85) 509 6721 ou +258 (86) 668 6317



AVES ICÓNICAS QUE DEVERIA CONHECER



Tal como as aves não reconhecem Fronteiras internacionais, os esforços de conservação devem seguir a mesma filosofia